

1.

LZ: Topoľčianky

Geolog. podložie: žula

Nadm. výška: 560 m.n.m

Relief terénu: širokozaoblený mierne zbiehajúci hrebeň

Zastúpenie drevín: dbz 50, hb 20, lpm 10, bk 10, jvm 10

Zápoj: 85 %

Charakteristika porastu: kvalitný hrabovo dubový porast prevažne semenného pôvodu

Aspekt: letný

1.	dbz	10
	bk	5
	lpm	10
2.	hb	10
	dbz	45
	jvm	10
	bk	10
3.	hb	30
4.	bk	+
	jvp	+
	hb	10
5 _{1a}	lpm	+
	hb	+
5 _{1b}	dbz	10
	hb	10
	jvp	+
5 ₂	hb	+
	dbz	+

Orograf.celok: Trábeč

Pôdny typ: kambizem

Exp., sklon: SSZ, 10°

Zakmenenie: 07

Vek porastu: 100 r.

Celkový kryt: 90 %

Alliaria petiolata 1+2
Lathyrus vernus 1–2
Poa nemoralis 1
Dentaria bulbifera –2
Fragaria vesca +:1
Carex pilosa +2
Melica uniflora –2
Galium odoratum +3
Symphytum tuberosum 1
Stellaria holostea –2
Polygonatum multiflorum +
Ranunculus repens –
Convallaria majalis 1
Pulmonaria officinalis +
Asarum europaeum 1
Viola reichenbachiana 1
Tithymalus amygdaloides +
Cruciata glabra +
Mercurialis perennis –3
Glechoma hirsuta 1
Melica nutans +⁻²
Geranium robertianum –2
Galium aparine 1
Mycelis muralis +

2.

LZ: Krupina

Geolog. podložie: andezit

Nadm. výška: 350 m.n.m

Relief terénu: vertikálne prehnutý, mierne zvlnený a vypuklý svah, balvany 40 %

Zastúpenie drevín: dbz 70, bk 10, lp 5, hb 5, jvm 10

Zápoj: 80 %

Charakteristika porastu: porast strednej kvality, ojedinele kvalitné kmene duba

Aspekt: letný

Orograf.celok: Krupinská vrchovina

Pôdny typ: kambizem

Exp., sklon: JV, 20°

Zakmenenie: 06

Vek porastu: 90 r.

Celkový kryt: 55 %

1. dbz 10

jm 10

bk +

2. dbz 60

lp 5

bk 5

3. hb 5

dbz 5

bk +

4. hb 15

bk 5

5_{1a} hb +

lieska +

hloh +

5_{1b} hloh +

Symphytum tuberosum 1

Urtica dioica 1

Poa nemoralis –2

Lathyrus niger 1

Lamium maculatum +2

Alliaria petiolata 1

Dactylis glomerata 1

Melica nutans 1–2^{–3}

Origanum vulgare –2

Melittis melisophyllum 1

Campanula rapunculoides 1–2

Melica uniflora +2

Trifolium alpestre –2

Stellaria holostea –2–3

Vicia cassubica –

Brachypodium sylvaticum –2

Galium schultesii 1

Lathyrus vernus +

Veronica officinalis +:1

Vincetoxicum hirundinaria 1

Pyrethrum corymbosum 1

Mercurialis perennis +2^{–3}

3.

LZ: B.Bystrica

Geolog. podložie: granit

Nadm. výška: 820 m.n.m

Relief terénu: pravidelný, mierne vypuklý svah s kopčekami po vývratoch, ojedinele povrchové skaly

Zastúpenie drevín: bk 60, jd 10, jvh 10, jvm 10, lp 10, sm + **Zakmenenie:** 08

Zápoj: 90 %

Vek porastu: 100 r.

Charakteristika porastu: nekvalitný, výchovne zanedbaný porast, buk väčšinou s výmladkov, jedľa odumiera, zle vyvetvená, smrek spádovitý, cenné listnáče prevažne v podúrovni

Aspekt: letný

Celkový kryt: 70 %

1.2.	jd	20
	bk	60
	sm	+
	lp	5
	jvh	5
	jvm	5
3.	bk	+
	lp	5
4.	jvh	10
	bth	5
5 _{1a}	bk	+
	jvh	5
5 _{1b}	sm	+
	bth	5

Festuca altissima +
Poa nemoralis +:1
Lamium maculatum 1–2
Impatiens noli-tangere +2
Stachys sylvatica 1
Carex pilosa –
Dentaria bulbifera +2
Asarum europaeum 1–2
Polygonatum verticillatum 1
Polygonatum multiflorum +
Pulmonaria officinalis 1
Athyrium filix-femina +
Geranium robertianum –3
Prenanthes purpurea +
Sanicula europaea –2
Galeobdolon luteum 1
Mercurialis perennis +3–4
Dryopteris filix-mas +:1
Senecio nemorensis +
Mycelis muralis +:1
Rubus hirtus –2
Tithymalus amygdaloides 1
Galium odoratum 1^{–3}

4.

LZ: Kriváň

Geolog. podložie: žula

Nadm. výška: 920 m.n.m

Relief terénu: prudký, pravidelný svah, slabo preliakly, zvažujúci sa do úžľabiny

Zastúpenie drevín: bk 40, jvh 30, sm 30, jd +

Zápoj: 75 %

Charakteristika porastu: rôznoveký a rôznorodý porast pekného vzrastu a kvality, pomiestne stojace sucháre

Aspekt: letný

Orograf.celok: Veporské vrchy

Pôdny typ: kambizem

Exp., sklon: SZ, 30°

Zakmenenie: 07

Vek porastu: 120 r.

Celkový kryt: 100 %

1.	jd	+
	sm	10
	jvh	20
	bk	20
2.	jd	+
	sm	10
	bk	30
3.	bk	5
	lp	+
	jvh	5
4.	bk	+
	sm	+
5 _{1a}	jd	5
	jvh	5
5 _{1b}	bk	+
5 ₂	sm	5
	jd	5

Oxalis acetosella +3
Galium odoratum +2
Polystichum aculeatum 1–2
Impatiens noli-tangere +:1⁻²
Mercurialis perennis +3
Athyrium filix-femina –3
Senecio nemorensis 1–2⁻³
Actaea spicata 1
Circaea lutetiana 1
Salvia glutinosa –2
Galeobdolon luteum +3
Stellaria nemorum 1+2
Prenanthes purpurea –2
Cicerbita alpina +:1
Polygonatum verticillatum 1
Sanicula europaea 1
Dryopteris dilatata 1–2
Dentaria bulbifera 1
Petasites albus –2
Doronicum austriacum +¹
Lunaria rediviva 1
Aconitum variegatum 1
Dryopteris filix-mas +2

5.

LZ: Kriváň

Geolog. podložie: andezit

Nadm. výška: 920 m.n.m

Relief terénu: sprehýbaný, balvanovitý svah bočného hrebeňa

Zastúpenie drevín: bk 30, jvh 20, sm 30, jvm 10, btp 10

Zápoj: 80 %

Charakteristika porastu: hrúbkovo a výškovo diferencovaný porast priemernej kvality, s odumierajúcou jedľou

Aspekt: letný

Orograf. celok: Poľana

Pôdny typ: kambizem andozemná

Exp., sklon: S, 20°

Zakmenenie: 08

Vek porastu: 100 r.

Celkový kryt: 90 %

1.	jvh	10
	bk	30
2.	sm	30
	jvh	10
	bk	10
3.	jvh	+
	sm	5
4.	bk	5
	jvm	5
5 _{1a}	sm	+
	jd	+
	jvh	5
5 _{1b}	bk	+
5 ₂	jd	+
	sm	+
	bk	+
	jvh	5
	bp	+

Salvia glutinosa +2
Galeobdolon luteum -2
Dryopteris filix-mas 1-2⁻³
Dentaria bulbifera -2
Athyrium filix-femina +2
Senecio nemorensis 1⁻³
Impatiens noli-tangere -2
Galium odoratum -3
Prenanthes purpurea 1-2
Oxalis acetosella +2
Stellaria nemorum +2
Maianthemum bifolium 1
Sanicula europaea 1
Stachys sylvatica 1
Mercurialis perennis +2
Actaea spicata 1
Geranium robertianum -2
Senecio fuchsii -2
Rubus hirtus -2
Circaea lutetiana 1
Melandrium sylvestre +
Adoxa moschatelina +
Viola reichenbachiana 1
Gentiana asclepiadea +:1
Solidago virgaurea -
Rubus idaeus -2

6.

LZ: ŠLP TU Zvolen

Geolog. podložie: andezit

Nadm. výška: 350 m.n.m

Relief terénu: balvanovitý, mierne zvlnený svah

Zastúpenie drevín: db 30, hb 50, lp +, bk 20, jvm +

Zápoj: 90 %

Charakteristika porastu: hospodársky porast prevažne výmladkového pôvodu

Aspekt: letný

Orograf.celok: Kremnické vrchy

Pôdny typ: kambizem

Exp., sklon: JV, 10°

Zakmenenie: 07

Vek porastu: 100 r.

Celkový kryt: 90 %

1.	db	10
	bk	10
	hb	20
2.	hb	20
	db	5
	bk	15
	lp	5
	jvm	5
4.	hb	10
	bk	5
	jvm	+
5 _{1a} .	hb	5
	lp	5
5 _{1b} .	hb	+
	db	5
	hb	5
5 ₂ .	jvm	+
	hb	+
	db	+

Geranium robertianum 1
Galium schultesii 1
Melica nutans +2
Dentaria bulbifera -2⁻³
Fragaria vesca +:1
Ficaria verna +2
Mercurialis perennis +2-3
Campanula trachelium 1
Galium odoratum -3
Symphytum tuberosum 1
Stellaria holostea -2
Polygonatum multiflorum +:1
Ranunculus repens +
Convallaria majalis 1
Pulmonaria officinalis +
Asarum europaeum 1
Viola reichenbachiana +
Cruciata glabra -
Impatiens noli-tangere +:1
Melica uniflora 1-2
Carex pilosa +2
Ranunculus lanuginosus 1
Alliaria petiolata -2
Dactylis glomerata 1
Lathyrus vernus +

7.

LZ: Krupina

Geolog. podložie: kvartérne sedimenty

Nadm. výška: 380 m.n.m

Relief terénu: podsvahová plošina, mierne sa zvažujúca do doliny

Zastúpenie drevín: dbz 30, bk 25, jvm 30, hb 5, jvp 10

Zápoj: 80 %

Charakteristika porastu: porast strednej kvality, väčšinou výmladkového pôvodu, ojedinele kvalitné kmene duba

Aspekt: letný

Orograf.celok: Krupinská vrchovina

Pôdny typ: luvizem

Exp., sklon: J, 5°

Zakmenenie: 06

Vek porastu: 90 r.

Celkový kryt: 65 %

1.	dbz	30
	jvm	5
	bk	20
2.	dbz	10
	bk	10
	jvp	10
3.	hb	10
	dbz	5
	bk	+
	jvp	5
4.	hb	10
	bk	5
5 _{1a} .	hb	+
	lieska	+
	hloh	+
5 _{1b} .	hloh	+
	jvp	+
	jvm	+

Melica uniflora +2
Urtica dioica +
Poa nemoralis –2
Lathyrus niger 1
Astragalus glycyphyllos 1
Alliaria petiolata +2
Carex pilosa +2
Melica nutans 1–2³
Origanum vulgare –2
Lamium maculatum +2³
Melittis melisophyllum 1
Campanula rapunculoides 1–2
Tithymalus cyparissias 1
Trifolium alpestre 1
Dactylis glomerata +
Vicia cassubica 1
Brachypodium sylvaticum 1
Galium schultesii 1
Lathyrus vernus 1–2
Veronica officinalis +:1
Stellaria holostea 1+3
Galium odoratum +
Asarum europaeum +
Mercurialis perennis –2

8.

LZ: Malacky

Geolog. podložie: viate piesky

Nadm. výška: 170 m.n.m

Relief terénu: mierne zvlnená náhorná plošina

Zastúpenie drevín: dbl 70, hb 20, lp 5, jvp 5

Zápoj: 80 %

Charakteristika porastu: kvalitný dubový porast výmladkového pôvodu, s prímiesou hraba

Aspekt: letný

Orograf.celok: Záhorská nížina

Pôdny typ: kambizem psefitická

Exp., sklon: J, 5°

Zakmenenie: 08

Vek porastu: 90 r.

Celkový kryt: 80 %

1.2.	dbl	60
	hb	10
	lp	5
	jvp	15
3.	dbl	+
	jvp	5
4.	bo	+
	lp	+
5 _{1a}	db	+
	bo	+
	jvp	+
5 _{1b}	db	+
	jvp	+

Pyrethrum corymbosum 1–2
Genista pilosa +:1
Melica uniflora +2
Galium aparine 1–2
Thymus serpyllum +
Brachypodium sylvaticum +2
Stellaria holostea +2–3
Poa angustifolia 1–2⁺³
Melica uniflora –2
Dactylis glomerata 1–2
Torylis japonica 1
Melica transsilvanica 1–2
Astragalus glycyphyllos 1
Betonica officinalis +:1
Bromus sterilis 1–2
Carex michelii 1
Alliaria petiolata 1-2
Melittis melisophyllum +:1
Vincetoxicum hirundinaria 1
Primula veris +
Galium schultesii 1
Tithymalus cyparissias +:1
Antenaria dioica +
Genista germanica +
Sedum acre 1
Festuca pseudodalmatica 1
Sedum album +

9.

LZ: Malacky

Geolog. podložie: viate piesky

Nadm. výška: 180 m.n.m

Relief terénu: mierne zvlnená rovina pozvoľne sa zvažujúca k juhu

Zastúpenie drevín: dbz 80, hb 5, bk 10, jvp 5, lp +

Zápoj: 70 %

Charakteristika porastu: kvalitný dubový porast výmladkového pôvodu, s prímесou cenných listnáčov

Aspekt: letný

Orograf.celok: Záhorská nížina

Pôdny typ: kambizem psefitická

Exp., sklon: J, 5°

Zakmenenie: 07

Vek porastu: 100 r.

Celkový kryt: 90 %

1.2.	dbz	65
	hb	5
	bk	10
	lp	+
	jvm	+
3.	dbl	+
	jvp	+
	jvm	+
4.	bo	+
	lp	+
5 _{1a}	db	+
	bo	5
5 _{1b}	db	+
	jvp	5

Melica uniflora 1–2
Dactylis glomerata –2
Campanula trachelium 1–2
Lamium maculatum +2
Geranium robertianum –2
Melica nutans –2⁺³
Dactylis glomerata 1–2
Astragalus glycyphyllos 1–2
Betonica officinalis 1+2
Festuca valesiaca –2
Melitis melisophyllum 1
Vincetoxicum hirundinaria 1+2
Pyrethrum corymbosum –2
Genista pilosa 1–2
Thymus serpyllum +
Brachypodium sylvaticum +2–3
Stellaria holostea 1+3
Poa angustifolia 1–2⁻³
Bromus sterilis –2
Carex michelii 1–2
Tithymalus cyparissias 1
Chaerophyllum temulum 1
Primula veris +:1
Galium schultesii 1–2

10.

LZ: B. Bystrica

Geolog. podložie: karbonáty

Nadm. výška: 640 m.n.m

Relief terénu: pravidelný, až slabo vypuklý svah pomiestne balvanovitý

Zastúpenie drevín: sm 30, jd 30, bk 20, jvm 10, lp 5, btp 5

Zápoj: 70 %

Charakteristika porastu: vysokoprodukčný porast s kvalitnými jedincami jedle, buka a cenných listnáčov

Aspekt: letný

Orograf.celok: Nízke Tatry

Pôdny typ: kambizem

Exp., sklon: SV, 15°

Zakmenenie: 08

Vek porastu: 100 r.

Celkový kryt: 60 %

1.	jd	10
	bk	10
	sm	10
2.	jd	10
	bk	5
	sm	10
	jvm	5
	bp	5
	lp	10
3.	bk	5
	jvm	10
4.	jd	5
	bk	+
	jvm	5
	bp	+
51a.	jd	+
	sm	+
51b.	bk	5
	lp	+
	bp	+
52.	jd	+
	sm	+
	jvm	+
	bp	+

Carex sylvatica +
Mycelis muralis 1
Dryopteris filix-mas +
Galium odoratum +3
Athyrium filix-femina +:1
Polygonatum verticillatum +:1
Rubus hirtus –2
Impatiens noli-tangere 1–2
Salvia glutinosa +2-3
Oxalis acetosella +
Tithymalus amygdaloides 1
Pulmonaria officinalis –2
Hedera helix 1
Isophyrum thalictroides –2
Dentaria enneaphyllos 1
Lathyrus vernus 1
Mercurialis perennis –4
Actaea spicata –2
Senecio ovatus +
Rubus idaeus +
Brachypodium sylvaticum +¹
Viola reichenbachiana 1
Salvia glutinosa –
Paris quadrifolia +
Galeobdolon luteum +

11.

LZ: Beňuš

Geolog. podložie: rula

Nadm. výška: 1150 m.n.m

Relief terénu: prudký, bralnatý svah v strednej časti prechádzajúci do úžľabiny, so stopami po vývratoch

Zastúpenie drevín: sm 20, jd 10, bk 10, jvh30, bp20, jvm10

Zápoj: 80 %

Charakteristika porastu: hrúbkovo a výškovo diferencovaný porast priemernej kvality, s odumierajúcou jedľou

Aspekt: letný

Orograf.celok: Slovenské rudohorie

Pôdny typ: kambizem

Exp., sklon: JV, 20°

Zakmenenie: 07

Vek porastu: 120 r.

Celkový kryt: 70 %

1.	sm	20
	jd	5
	jvh	10
2.	jvp	5
	sm	10
	jvh	10
	bp	20
	jvm	10
3.	sm	+
	bk	5
	bp	+
	jvh	5
4.	jd	+
	jvm	+
	sm	5
	bk	+
	bp	+
	lp	+
5 _{1a}	sm	+
5 _{1b}	bk	+
5 ₂	sm	+
	bk	+
	js	+
	bp	5

Sanicula europaea 1–2
Mycelis muralis 1
Dryopteris filix-mas –2
Galium odoratum –3
Athyrium filix-femina +3
Polygonatum verticillatum –2
Rubus hirtus 1⁻³
Petasites albus 1
Oxalis acetosella +3
Tithymalus amygdaloides 1
Impatiens noli-tangere +2
Stellaria nemorum –3
Pulmonaria officinalis 1
Urtica dioica +:1⁻²
Hesperis nivea 1
Lathyrus vernus +
Aconitum variegatum 1
Aruncus sylvestris +
Senecio ovatus +2
Actaea spicata 1
Mercurialis perennis +3
Viola reichenbachiana 1
Prenanthes purpurea –
Hordelymus europaeus 1
Galeobdolon luteum –

12.

LZ: Brezno

Geolog. podložie: žula

Nadm. výška: 1150 m.n.m

Relief terénu: prudký, kamenitý až balvanitý svah v strednej časti vypuklý, so stopami po vývratoch

Zastúpenie drevín: sm 40, jd 10 ,bk 5, jvh 10, btp 10, lp 5, jvm 20 **Zakmenenie:** 07

Zápoj: 70 %

Vek porastu: 110 r.

Charakteristika porastu: hrúbkovo a výškovo diferencovaný porast priemernej kvality, s odumierajúcou jedľou

Aspekt: letný

Celkový kryt: 80 %

1. sm 20

jd 10

bk 5

2. jvh 5

sm 10

jvh 5

bk +

jvm 15

btp 20

lp +

3. sm +

bk 5

4. jd +

sm 5

bk +

51a. sm +

51b. bk +

52. sm +

Sanicula europaea –2

Galium odoratum –2–3

Dryopteris filix-mas +2

Pulmonaria officinalis 1

Athyrium filix-femina +3

Polygonatum verticillatum 1

Rubus hirtus 2⁻³

Petasites albus +

Stellaria nemorum –3

Aconitum variegatum 1

Oxalis acetosella +2

Tithymalus amygdaloides 1

Ranunculus lanuginosus +

Mycelis muralis +:1

Doronicum austriacum 1

Senecio nemorensis –2

Actaea spicata 1

Mercurialis perennis –3

Adenostyles alliariae –

Galeobdolon luteum 1–2

Viola reichenbachiana –2

Impatiens noli-tangere 1

Maianthemum bifolium 1

Cardamine impatiens –

Urtica dioica +⁻³

Dentaria bulbifera 1

Senecio ovatus +

13.

LZ: Predajná

Geolog. podložie: granodiorit

Nadm. výška: 820 m.n.m

Relief terénu: pravidelný, mierne vypuklý svah s kopčekami po vývratoch, ojedinele povrchové skaly

Zastúpenie drevín: bk 65, jd 10, jvh 5, sm 10, lp 10 ,

Zápoj: 90 %

Charakteristika porastu: prirodzený les, stopy po prebierkach, jedľa odumiera, zle vyvetvená, smrek spádovitý

Aspekt: letný

Orograf.celok: Nízke Tatry

Pôdny typ: kambizem

Exp., sklon: SZ, 20°

Zakmenenie: 08

Vek porastu: 100 r.

Celkový kryt: 90 %

1.2. jd 10

bk 50

sm 5

jvh 5

lp 10

3. bk +

jvh 5

4. sm 5

lp 5

5_{1a}. bk +

5_{1b}. sm +

jd +

jvh +

Stachys sylvatica +

Carex digitata 1

Geranium robertianum +2–3

Carex pilosa +

Dentaria enneaphyllos –2

Dentaria bulbifera 1

Asarum europaeum 1⁺2

Polygonatum verticillatum 1

Polygonatum multiflorum +

Pulmonaria officinalis 1

Salvia glutinosa 1

Prenanthes purpurea +:1

Sanicula europaea +2

Galium odoratum 1

Galeobdolon luteum –2

Mercurialis perennis –3

Oxalis acetosella +

Dryopteris filix-mas +:1

Senecio nemorensis +

Hordelymus europaeus +

Mycelis muralis –

Rubus hirtus +

Hieracium murorum –

Urtica dioica 1

14.

LZ: LZ Krupina

Geolog. podložie: sprašové hliny

Nadm. výška: 450 m.n.m

Relief terénu: mierne zvlnený a vypuklý mierny svah bez skeletnatosti

Zastúpenie drevín: dbz 60, bk 30, lpm 5, hb 5

Zápoj: 90 %

Charakteristika porastu: porast strednej kvality, ojedinele kvalitné kmene duba , buk poškodený neskorými mrazmi

Aspekt: letný

1.	dbl	70
	lpm	+
	bk	10
2.	cer	10
3.	hb	10
	dbl	5
	bk	+
4.	hb	10
	bk	5
5 _{1a} .	hb	+
	lieska	+
5 _{1b} .	hloh	+

Orograf.celok: Krupinská vrchovina

Pôdny typ: kambizem koluviálna

Exp., sklon: J, 10°

Zakmenenie: 06

Vek porastu: 90 r.

Celkový kryt: 60 %

Melica uniflora –3
Urtica dioica +⁻³
Poa nemoralis +
Lathyrus niger –2
Veronica chamaedrys +
Melica nutans –
Origanum vulgare –2
Melittis melissophyllum 1–2
Campanula rapunculoides +2
Tithymalus amygdaloides +
Trifolium alpestre +
Vicia cassubica 1
Mercurialis perennis +3
Dactylis glomerata 1
Brachypodium sylvaticum –2
Galium schultesii 1
Lathyrus vernus –
Veronica officinalis –
Glechoma hirsuta +
Stellaria holostea +–2⁻³
Silene nutans 1
Alliaria petiolata –2
Chelidonium majus 1
Impatiens parviflora 1

15.

LZ: Predajná

Geolog. podložie: vápenec

Nadm. výška: 1370 m.n.m

Relief terénu: prudký, miestami kamenistý až balvanovitý svah

Zastúpenie drevín: sm 95, jvh 5, jrb +

Zápoj: 60 %

Charakteristika porastu: medzernatý, pôvodný smrekový porast s prímiesou pokrúteného javora horského v podúrovni

Aspekt: letný

Orograf.celok: Nízke Tatry

Pôdny typ: rendzina organozemná

Exp., sklon: Z, 30°

Zakmenenie: 06

Vek porastu: 120 r.

Celkový kryt: 80 %

1.2. sm 50

3. jvh 10

jrb 5

sm 5

4. jrb +

bk +

5_{1a}. sm +

jrb +

bk +

Lonicera nigra 1

Rosa pendulina +

Ribes petraeum 1

5_{1b}. sm 1

jrb +

Lonicera nigra 1

Hylocomium splendens 1

Luzula luzuloides +¹

Oxalis acetosella 1–2

Stellaria nemorum +3

Luzula sylvatica –2

Homogyne alpina 1

Dryopteris carthusiana +:1

Viola reichenbachiana 1

Adoxa moschatelina 1

Mercurialis perennis –2

Prenanthes purpurea –2

Vaccinium myrtillus 1

Doronicum austriacum 1

Rubus idaeus 1

Rubus hirtus +

Cardamine amara 1

Athyrium distentifolium –2

Dryopteris filix-mas 1

Athyrium filix-femina +2

Petasites albus –2

Chrysosplenium alternifolium +

Senecio nemorensis 1

Adenostyles alliariae –3

Calamagrostis arundinacea +

Senecio subalpinus 1

Galeobdolon luteum +

Acetosa alpestris 1